Adresse:
Talstr. 7
01099 Dresden

Kontakt:
Telefon: 015773998502
E-Mail: pdf@energyvital.de

Rechtliches:
Amtsgericht Dresden
USt-ID-Nr.: DE352285297

## Panoramica

# Test per l'intolleranza all'istamina

**Codice prodotto:** MV3126




**Prezzo**

**69,00 €**

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

## Descrizione

### L'amminoacido istidina appartiene agli ormoni tissutali

In caso di degradazione dell'istamina non ottimale, in particolare quando si accumulano grandi quantità di istamina e l'attività degli enzimi degradanti l'istamina come la diaminossidasi (DAO) e l'istamina N-metiltransferasi (HNMT) nel fegato è insufficiente, può svilupparsi una quantità eccessiva di istamina nell'organismo. Un'intolleranza all'istamina (HIT) rappresenta quindi un segno dello squilibrio tra l'istamina prodotta e la sua degradazione. Non

Adresse:
Talstr. 7
01099 Dresden

Kontakt:
Telefon: 015773998502
E-Mail: pdf@energyvital.de

Rechtliches:
Amtsgericht Dresden
USt-ID-Nr.: DE352285297

solo gli alimenti ad alto contenuto di istamina influenzano la quantità di istamina nell'organismo: anche un numero eccessivo di batteri produttori di istamina nell'intestino, allergie o farmaci che inibiscono la degradazione dell'istamina possono avere effetti.

I disturbi che tipicamente si manifestano in caso di istaminosi possono essere molteplici. Un contenuto eccessivo di istamina può causare problemi circolatori, mal di testa, difficoltà respiratorie, sintomi simili alle allergie ed eruzioni cutanee. Possono inoltre verificarsi disturbi gastrointestinali quali dolori allo stomaco, bruciore di stomaco, crampi, gonfiore e diarrea. Con questo test urinario viene determinata l'istamina e i suoi metaboliti nelle urine.

Nel tratto intestinale la principale degradazione dell'istamina avviene tramite l'enzima diaminossidasi (DAO), formando imidazoloacetaldeide e acido imidazoloacetico. Come secondo percorso di degradazione intracellulare, l'istamina viene trasformata dall'N-metiltransferasi nei prodotti N-metilistamina, N-metilimidazoloacetaldeide e acido N-metilimidazoloacetico. Le relazioni tra N-metilistamina e istamina così come tra acido imidazoloacetico e istamina permettono di ottenere indicazioni sulla funzione della DAO e sull'attività della HNMT.

**Vengono esaminati i seguenti parametri:**

- Istamina
- Acido imidazoloacetico
- Rapporto acido imidazoloacetico/istamina
- N-metilistamina
- Acido N-metilimidazoloacetico
- Rapporto N-metilistamina/istamina per la diagnosi

I risultati costituiscono la base per una terapia su misura, che però dovrebbe essere eseguita solo dopo consultazione con un medico o un terapeuta.

**Il set di test comprende:**

- 1 Istruzione per il prelievo del campione
- 1 contenitore per urine
- 1 provetta gialla per urine (Urin-Monovette)
- 1 puntale giallo
- 1 contenitore per la spedizione della Urin-Monovette
- 1 busta di spedizione

### Come avviene il processo d'ordine?

Dopo il suo ordine le sarà inviato il pacchetto di test desiderato con istruzioni dettagliate. Lei deposita il suo campione in un contenitore per campioni, lo invia in una busta preparata al laboratorio partner di Medivere GANZIMMUN Diagnostics GmbH e dopo 5-7 giorni riceverà un referto con la valutazione del suo profilo.

## Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| **Tipo di test:** | Esame delle urine |
| **Tipo di prodotto:** | Dispositivo medico |